

Viikon lastentautikatsaus

Kuluneen viikon julkaisuissa korostuivat erityisesti suuret väestötason rekisteritutkimukset ja ennaltaehkäisyn vaikuttavuus, joista saatiin käytäntöä tukevaa näyttöä niin nirsevimabin tehokkuudesta RSV:tä vastaan kuin influenssan varhaisesta lääkehoidosta. Lisäksi julkaistiin useita merkittäviä tuloksia harvinaissairauksien kentältä, muun muassa laaja geenisekvensoinnin hyötyjä vuodeosastoilla arvioiva tutkimus sekä pitkään odotettu, mutta valitettavasti negatiiviseksi jäänyt satunnaistettu lääketutkimus ataksia-telangiectasiassa.

NOSTOT

Varhainen oseltamiviiri vähentää tehohoidon tarvetta influenssassa Yhdysvaltalaisessa kohorttitutkimuksessa (n=6044 tehohoitoanalyysissä) arvioitiin oseltamiviirin tehoa sairaalahoidossa olevilla lapsilla. Oseltamiviiri vähensi merkitsevästi teho-osastolle joutumisen riskiä (aHR, 0.69; 95 % CI, 0.60–0.80) ja lyhensi sairaalahoidon kestoa (kotiutumisen aHR, 1.13; 95 % CI, 1.06–1.21). Tulos on kliinisesti merkittävä ja tukee nykysuosituksia aloittaa antiviraalinen lääkitys mahdollisimman varhain influenssan vuoksi sairaalaan joutuneilla lapsilla. *JAMA Pediatr. Rytlewski K, et al. DOI*

Nirsevimabi on erittäin tehokas ensimmäisellä RSV-kaudella Massiivisessa ranskalaisessa kohorttitutkimuksessa (n=74 672 vuonna 2023 ja 175 526 vuonna 2024) selvitettiin nirsevimabin tehoa RSV-alahengitystieinfektioiden estossa. Nirsevimabi vähensi sairaalahoitoja ensimmäisenä vuotena tehokkaasti (suojateho 66 % [95 % CI, 61 %–70 %] vuonna 2023 ja 72 % [95 % CI, 69 %–75 %] vuonna 2024). Toisena elinvuotena suojavaikutusta ei enää havaittu, mutta tulokset vahvistavat nirsevimabin kiistattoman kliinisen tehon ja vähentävät merkittävästi sairaaloiden kuormitusta imeväisten ensimmäisenä talvena. *JAMA Pediatr. Gabet A, et al. DOI*

Keskosten varhainen enteraalinen ruokinta on turvallista Meta-analyysi kokosi 11 satunnaistettua tutkimusta (n=3145), joissa verrattiin alle 48 tunnin iässä aloitettua yksinomaista enteraalista ruokintaa (EEF) progressiivisesti nostettuun ruokintaan (PEF). Ryhmien välillä ei ollut eroa nekrotisoivan enterokoliitin (RR, 1.00; 95 % CI, 1.00–1.01; P=.53) tai sepsiksen riskissä, mutta EEF nopeutti täysien määrien saavuttamista ja lyhensi sairaalahoitoa. Kliinisesti tulos rohkaisee siirtymään nopeampaan enteraaliseen ruokintaan kohtalaisen riskin keskosilla ilman pelkoa NEC-riskin kasvusta. *Pediatrics. Santokh I, et al. DOI*

Rotavirusrokotus ehkäisee merkittävästi pikkulasten kuolleisuutta Laaja monikansallinen tapaus-verrokkitutkimus (n=27 252) arvioi rotavirusrokotteen tehoa kuolemaan johtavassa akuutissa maha-suolitulehduksessa. Rokotteen teho rotaviruspositiivista kuolleisuutta vastaan oli 75.8 % (95 % CI 28.4–91.8) ja kaikista syistä johtuvaa gastroenteriittikuolleisuutta vastaan 20.8 % (-47.0–57.3). Löydös osoittaa globaalisti rokotteen massiivisen merkityksen pikkulasten eloonjäämiselle alueilla, joilla gastroenteriittikuolleisuus on yhä korkea. *Lancet Child Adolesc Health. Moran MC, et al. DOI*

Alle kouluikäisenä alkanut tyyppin 1 diabetes ja myöhäiskomplikaatiot Australialainen väestöpohjainen kohortti (n=5202) tarkasteli T1D-diagnoosi-ään yhteyttä pitkäaikaiskomplikaatioihin. Alle 7-vuotiaana sairastuneilla oli merkittävästi pienempi riski saada komplikaatioita ensimmäisen 20 vuoden aikana verrattuna teini-ikässä sairastuneisiin: sydänkomplikaatioiden aHR 0.32 (95 % CI 0.15–0.66), vaikean retinopatian aHR 0.25 (0.17–0.36) ja munuaiskomplikaatioiden aHR 0.40 (0.30–0.53). Tämä kliinisesti tärkeä havainto tukee käsitystä, että prepubertaalinen aika on suhteellisen "suojaavaa" diabeettisten komplikaatioiden kehittymiselle. *Diabetes Care. Nielsen TC, et al. DOI*

Pikageenisekvensoinnin (RGS) hyöty vuodeosastoilla Retrospektiivinen analyysi (n=422) selvitti RGS:n vaikuttavuutta teho-osastojen (n=339) lisäksi myös tavallisilla vuodeosastoilla (n=83) hoidettavilla lapsilla. Osastopotilaiden diagnostinen saanto oli 39 % (32/83), ja diagnoosi johti hoitolinjan muutokseen 81 %:lla. Heistä 56 % (18/32) sai tautispesifisen intervention, yleisimmin metaboliseen sairauteen tai epilepsiaan. Tulos kannustaa laajentamaan RGS:n käyttöaiheita teho-osastojen ulkopuolelle epäiltäessä harvinaissairautta. *Genet Med. Porter JM, et al. DOI*

Deksametasonista ei tehoa ataksia-telangiektasiaan fasen 3 tutkimuksessa Monikansallinen, satunnaistettu ja lumekontrolloitu NEAT-faasin 3 tutkimus (n=105) arvioi punasoluihin kapseloidun deksametasonin (eDSP) tehoa ataksia-telangiektasiassa. Ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa RmICARS-neurologia-asteikossa puolen vuoden seurannassa (pienimmän neliösumman keskiarvojen ero -1.30; 95 % CI -2.77–0.18; p=0.085). Vaikka tulos on negatiivinen, tutkimus on alan suurin ja auttaa suuntaamaan harvinaisen rappeumataudin lääkekehitystä. *Lancet Child Adolesc Health. Russo S, et al. DOI*

BHI uutena murtumariskin mittarina osteogenesis imperfectassa Brittiläisessä kohorttitutkimuksessa (n=123) selvitettiin sormiluiden kuorikerroksesta mitattavan BHI-indeksin (Bone Health Index) kykyä ennustaa murtumia osteogenesis imperfectaa (OI) sairastavilla lapsilla. Yhden keskihajonnan lasku BHI SDS -arvossa lisäsi uuden murtuman todennäköisyyttä yli viisinkertaiseksi kahden vuoden sisällä (OR 5.26, 95 % CI 2.4–11.1, p<0.001) ja päihitti DXA:n erottelukyvyyssä (AUC 0.84 vs 0.60). Menetelmä tarjoaa kipeästi kaivatun työkalun pienten, alle 5-vuotiaiden OI-potilaiden luustoterveyden arviointiin. *J Clin Endocrinol Metab. Lanzafame R, et al. DOI*

Elvytyksen lopettamisen kriteereissä merkittävää vaihtelua Massiivinen amerikkalainen ensihoitorekisteritutkimus (n=45 045) selvitti lasten sairaalan ulkopuolisten sydänpysähdysten elvytyspäätöksiä. Elvytystä pidettiin hyödyttömänä ("futility") 6.6 %:ssa tapauksista, ja aloitetuista elvytyksistä 25.4 % lopetettiin kohteessa. Tulokset osoittivat huomattavaa ensihoitopalvelukohtaista vaihtelua: elvytyksen lopettamisen (TOR) mediaanivetosuhde eri organisaatioiden välillä oli peräti 3.50 (95 % CI 3.32–3.72), mikä viittaa siihen, että potilaan sijainti määrittää liiaksi hoidon kestoa. *Pediatrics. Ramgopal S, et al. DOI*

Kattava katsaus lasten ja aikuisten kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoihin "Umbrella review" kokosi 77 järjestelmällistä katsausta kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitomuodoista eri faaseissa. Lapsilla ja nuorilla masennusvaiheen tehokkaiksi lääkkeiksi osoittautuivat lurasidoni ja olantsapiinin ja fluoksetiinin yhdistelmä, kun taas maniavaiheessa näyttöä on aripipratsolista, asenapiinista, olantsapiinista, ketiapiinista ja risperidonista. Katsaus sisältää myös avoimen EBI-BD-verkkotyökalun, joka palvelee lääkäreitä suoraan vastaanottotilanteessa hoidon yksilöllisessä räätälöinnissä. *BMJ. De Prisco M, et al. DOI*

Sijoitettujen lasten terveystriskit näkyvät sairaalahoitajaksoina Kanadalaisessa väestötason seurannassa (n=31 595 sijaisperheessä asuvaa ja 5 317 346 muuta lasta) tutkittiin sijoitettujen lasten terveystilanteiden käyttöä. Sijaiskodeissa eläneillä lapsilla oli lähes kaksinkertainen sairaalaan joutumisriski (283 vs 140 per 1000, RR 1.94, 95 % CI 1.69–2.22), ja nuorilla aikuisilla yleisimmät syyt liittyivät mielenterveyteen, päihteisiin ja lisääntymisterveyteen. Löydös alleviivaa lastensuojelun asiakkaana olleiden valtavaa terveystuormaa ja varhaisen puuttumisen tarvetta. *Pediatrics. Quinn A, et al. DOI*

Upadasitinibi tehoa vitiligoon myös nuorilla Kahdessa faasin 3 satunnaistetussa tutkimuksessa (n=750) arvioitiin JAK-estäjä upadasitinibia vitiligon hoidossa yli 12-vuotiailla. Viikolla 48 T-VASI 50 -vasteen (yli 50 % repigmentaatio) saavutti upadasitinibilla 19–21 % potilaista verrattuna lumeryhmän 6 %:iin (p<0.001). Tulos tuo kliinisesti merkittävän ja kaivatun systeemisen hoitovaihtoehdon hankalasti hoidettavaan ja psykososiaalisesti kuormittavaan autoimmuunisairauteen. *Lancet. Passeron T, et al. DOI*

MUUT JULKAISUT

Diabetes

Jatkuvan glukoosiseurannan muuttujat, kuten yöllinen aika tavoitealueella, ennustavat raskauskomplikaatioita tyypin 1 diabeteksessa jopa perinteistä HbA1c-arvoa paremmin. — *Diabetes Technol Ther* — DOI

Endokrinologia, metaboliset sairaudet, lihavuus ja harvinaissairaudet

Ylipainon ja lihavuuden taloudellinen taakka Ruotsissa on arviolta 7 miljardia euroa, josta suurin osa johtuu tuottavuuden menetyksistä. — *Diabetes Obes Metab* — DOI Kliininen kohortti osoitti, että HMGCL-puutoksessa potilaiden pituuskasvu on normaalia, mutta aikuisillakin on riski hengenvaarallisiin aineenvaihduntakriiseihin. — *Mol Genet Metab* — DOI Galaktosemian globaali syntyvyys vaihtelee huomattavasti (1–5 tapausta 100 000 kohti), mihin vaikuttavat sekä perustajavaikutus että erot eri maiden seulontaohjelmissa. — *Mol Genet Metab* — DOI Tapausselostus kuvaa harvinaisen hepatoerytropoieettisen porfyrian 2-vuotiaalla lapsella, jolla oireita onnistuttiin lievittämään valosuojauksen ja simetidiinin yhdistelmällä. — *Mol Genet Metab* — DOI Kuuden uuden potilaan sarja korostaa beetamannosidoosin erittäin laajaa kliinistä kirjoa, johon voi kuulua kehitysviivettä ja kuulonalenemaa ilman selkeää korrelaatiota geenimuutoksen kanssa. — *Mol Genet Metab* — DOI Ison-Britannian "Eatwell"-ravitsemussuosittelujen tiukempi noudattaminen on laajassa biopankkiaineistossa yhteydessä hitaampaan kehon rasvakudoksen lisääntymiseen. — *Int J Obes (Lond)* — DOI Nuoruusiän korkea painoindeksi näyttää kiihdyttävän biologista vanhenemista erityisesti niillä, joilla on siihen myös korkea geneettinen riski. — *Int J Obes (Lond)* — DOI Espanjalaisilla leikki-ikäisillä havaitut syömiskäyttäytymisprofiilit korreloivat selvästi kehon koostumuksen ja rasvan määrän kanssa jo varhain. — *Obesity (Silver Spring)* — DOI Retrospektiivinen katsaus muistuttaa, että MEN2B-oireyhtymää epäiltäessä varhaiset ei-endokriiniset merkit, kuten vaikea ummetus ja synnynnäinen kipurajalka, voivat nopeuttaa hengenpelastavaa diagnoosia. — *Pediatrics* — DOI Kohonnut seerumin kystatiini C toimii lihavilla lapsilla munuaismerkkiaineen lisäksi myös varhaisena insuliiniresistenssin ja lisääntyneen keskivartalolihavuuden ilmentäjänä. — *Horm Res Paediatr* — DOI

Neonatologia

Sairaaloitten uusien ohjeistusten myötä vastasyntyneisiin kohdistuneet lastensuojeluilmoitukset vähenivät erityisesti, jos äidin raskaudenaikainen opioidialtistus johtui yksinomaan lääkärin määräyksestä. — *Pediatrics* — DOI Varhain vastasyntyneiden teholla aloitettu vanhempia osallistava motoriikkainterventio (SPEEDI) parantaa keskosten kognitiivisia ja motorisia taitoja verrattuna myöhemmin aloitettuun tukeen. — *J Pediatr* — DOI Sairaalassa annettavat suuret korvikemäärät vähentävät merkittävästi myöhäiskeskosten ja lievästi ennenaikaisten täysimetystä ensimmäisten elinviikkojen aikana. — *Acta Paediatr* — DOI Vastasyntyneisyyskauden kenguruhoito saattaa pienentää aivopuoliskojen välisen motorisen viestinnän häiriöitä pienipainoisina syntyneillä vielä aikuisuudessakin. — *Acta Paediatr* — DOI Kyselytutkimus paljastaa merkittävää hajontaa saksankielisten maiden sairaaloitten välillä siinä, millä asetusarvoilla ja välineillä eriaisteisia keskosa ja täysiaikaisia primääristi ventiloitetaan synnytyssalissa. — *Acta Paediatr* — DOI Intialaisessa aineistossa vastasyntyneiden kuolleisuus on merkittävästi laskenut 40 vuodessa tehohoitotekniikoiden kehittyessä, vaikka erittäin pienipainoisten keskosten määrä on kasvanut. — *Arch Dis Child* — DOI

Allergologia, immunologia ja keuhkosairaudet

Vain kolmannes kouluista piti saatavilla lasten avaavia astmalääkkeitä ja tilanjatkeita, mutta aiempi sairaalahoitoa vaatinut pahenemisvaihe lisäsi hieman koulun valmiutta. — Pediatrics — DOI

Infektiosairaudet

Yhdysvaltain lastenlääkärijärjestö AAP suosittelee influenssarokotusta rutiinina kaikille yli 6 kuukauden ikäisille sekä oireisten ja riskiryhmien varhaista hoitoa antiviraaleilla kaudelle 2026–2027. — Pediatrics — DOI AAP:n tekninen raportti luo yksityiskohtaisen tieteellisen pohjan influenssarokotusten tyyppien ja lääkehoitojen valintaan lapsiväestössä. — Pediatrics — DOI Katsausartikkeli vesirokosta tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita viruksen estämiseksi ja hoitamiseksi rokotuskattavuuden heikentyessä eräillä alueilla. — Pediatrics — DOI Kirjallisuuskatsaus tuo esille uusien, imeväisille suunnattujen pitkävaikutteisten RSV-monoklonaalisten vasta-aineiden ja äideille annettavien rokotusten erinomaisen tehon ja turvallisuuden. — Acta Paediatr — DOI

Hemato-onkologia

Lyhyt raportti käsittelee leukovoriinin käyttöä ja saatavuutta yhdysvaltalaislapsilla vuoden 2025 aikana. — N Engl J Med — DOI Kirjeessä kuvataan PRAME-spesifisen T-soluterapian soveltuvuutta pitkälle edenneen lasten nefroblastooman kokeellisena hoitona. — N Engl J Med — DOI Chilessä vuosina 2001–2024 tehty väestötutkimus paljastaa, että lasten ja erityisesti nuorten kilpirauhassyövän sairaalahoitajaksot ovat kääntyneet merkittävään nousuun. — Horm Res Paediatr — DOI

Akuuttipediatria, tehohoito ja lastenkirurgia

Lyhyt kliininen huomio korostaa peräaukon epämuodostumien järjestelmällisen havainnoinnin tärkeyttä vastasyntyneiden ohjeistuksissa. — Arch Dis Child — DOI Ugandalaisaineisto paljastaa, että sairaalasta vastoin lääkärin ohjetta kotiutuvien pienten lasten myöhempi kuolleisuus (13.4 %) on merkittävästi korkeampi kuin suunnitellusti kotiutettujen (5.1 %). — Arch Dis Child — DOI

Yleispediatria ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

Katsausartikkeli puoltaa perinataalikauden vastikkeettomia raha-avustuksia riskiryhmille keinona vähentää ennenaikaisen syntymän eriarvoisuutta. — Pediatrics — DOI Iso-Britanniassa tehty kyselytutkimus korostaa kliinikkolastenlääkäreiden korkeaa halua osallistua tutkimustyöhön, jota kuitenkin jarruttavat rahoituksen ja työajan puute. — Arch Dis Child — DOI Laaja brittikohortti osoitti, että pakistanilaistaustaisille lapsille diagnosoit atoopisista sairauksista kertyvät varhaisemmin ja neurokehityksellisistä viiveistä huomattavasti harvemmin kuin valkoihoisille. — Arch Dis Child — DOI Käytännönläheinen artikkeli opastaa suunnattujen asyklisten verkkojen (DAG) käyttöön tilastollisten harhojen, kuten törmäjäharhan, välttämiseksi lastentautien havainnoivissa tutkimuksissa. — Arch Dis Child — DOI Artikkelin käsittelee lääkinnällistä laiteriippuvuutta omana keskeisenä, elinjärjestelmien rajat ylittävänä haasteena lasten medikaalisessa monimuotoisuudessa. — J Pediatr — DOI Raskaudenaikainen välimeren ruokavalio -interventio todettiin turvalliseksi, mutta sillä ei ollut merkittävää suojaavaa vaikutusta lapsen verenpaineeseen tai kehonmittoihin kolmen vuoden iässä. — Acta Paediatr — DOI

HUOMIOITAVAA

Tutkimusviikko kuvastaa kliinisen tutkimuksen kahta päätä: toisaalta valtavat tuhansien potilaiden rekisteriaineistot (kuten RSV- ja influenssatutkimukset) ohjaavat käytäntöä välittömästi erittäin luotettavalla näytöllä, ja toisaalta harvinaissairauksien parissa jopa faasin 3 satunnaistettu, vuosia kestänyt interventiotutkimus (esim. ataksia-telangiektasia) saattaa tuottaa kliinisesti marginaalisen tai negatiivisen tuloksen kertoen vaikeasti taltutettavista neurodegeneratiivisista sairauksista. BHI-murtumariskin osoittaminen osteogenesis imperfectassa tuo osaltaan tervetulleeseen apuvälineen pienten lasten seurantaan.

Tämä on tekoälyn automaattisesti tuottama tiivistelmä alkuperäisistä tiivistelmistä. Tarkista kliinisesti merkittävät tiedot alkuperäisjulkaisusta.

LÄHDEARTIKKELIT

1. Leucovorin Dispensing to U.S. Children in 2025.
N Engl J Med · 2026-Aug-13 · Chua KP, He S, Conti RM
2. PRAME-Specific T-Cell Therapy in Advanced Pediatric Nephroblastoma.
N Engl J Med · 2026-Aug-13 · Mair K, Rossi C, Westhoff JH ym.
3. Efficacy and safety of upadacitinib in adults and adolescents for treatment of non-segmental vitiligo (Viti-Up): results of two phase 3 randomised controlled studies.
Lancet · 2026-Aug-15 · Passeron T, Prajapati VH, Sivamani RK ym.
4. Evidence based interventions for bipolar disorder across phases and age groups: living umbrella review, evaluation, analysis, and communication hub (U-REACH) project.
BMJ · 2026-08-11 · De Prisco M, Oliva V, Miola A ym.
5. Bone Health Index (BHI): a Fracture Risk Assessment tool in Children with Osteogenesis Imperfecta.
J Clin Endocrinol Metab · 2026-08-13 · Lanzafame R, Calder AD, Crowe B ym.
6. Adult Complications of Childhood-Onset Type 1 Diabetes Vary With Age at Diagnosis: A Population-Based Study.
Diabetes Care · 2026-08-13 · Nielsen TC, Lain SJ, Craig ME ym.
7. Economic Burden of Overweight and Obesity in Sweden: Current Estimates and Future Projections.
Diabetes Obes Metab · 2026-08-09 · Fridhammar A, Dahlgren J, Galavazi M ym.
8. CGM Metrics and the Risk of Pregnancy Complications in Type 1 Diabetes: A Secondary Exploratory Analysis of the CRISTAL Trial.
Diabetes Technol Ther · 2026-08-12 · Geerts I, Beunen K, Berger L ym.
9. Rapid Genome Sequencing Identifies Treatable Conditions in Non-Intensive Care Unit Hospitalized Children.
Genet Med · 2026-08-11 · Porter JM, Palmquist R, Solorzano C ym.
10. Clinical trajectory and long-term management of 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA lyase deficiency: Insights from a lifespan cohort.
Mol Genet Metab · 2026-08-05 · Calisgan K, Uygur E, Bayhan B ym.
11. Global birth prevalence of galactosemia and the role of neonatal screening: A scoping review.
Mol Genet Metab · 2026-08-08 · Pessi AV, de Lima Spode Coutinho V, Dos Santos BB ym.
12. Hepatoerythropoietic porphyria in a 2-year-old child: Clinical features and effects of treatment.
Mol Genet Metab · 2026-08-08 · Bensaber N, Tran B, Rebeiz L ym.
13. Phenotype variability in six new patients with beta-mannosidosis.
Mol Genet Metab · 2026-08-06 · Olivas M, Romano C, Martin A ym.
14. Adherence to the Eatwell Guide and associations with markers of adiposity: a prospective analysis within the UK Biobank cohort.
Int J Obes (Lond) · 2026-08-13 · Griffiths A, Gregory S, Malcomson FC ym.
15. Adolescent weight gain trajectories and their associations with biological aging: a genetically informed study.
Int J Obes (Lond) · 2026-08-12 · Pitkänen A, Kankaanpää A, Raitoharju E ym.
16. Eating Behavior Latent Profiles and Their Associations With Body Composition in Early Childhood: The CORALS Cohort.
Obesity (Silver Spring) · 2026-08-09 · Jimeno-Martínez A, Miguel-Berges ML, Maneschy I ym.
17. Effectiveness of Oseltamivir in Hospitalized Children With Laboratory-Confirmed Influenza, 2014-2023.
JAMA Pediatr · 2026-08-10 · Rytlewski K, Dunn A, O'Halloran A ym.
18. First- and Second-Year Outcomes After Nirsevimab Immunization.
JAMA Pediatr · 2026-08-10 · Gabet A, Kolla E, Tréluyer L ym.

19. **Asthma Exacerbation Risk and School Asthma Readiness.**
Pediatrics · 2026-08-10 · Kenyon CC, Negro D, Fluehr J ym.
20. **Discretionary Child Protective Services Reporting for Infants With Prenatal Opioid Exposure.**
Pediatrics · 2026-08-13 · Khazanchi R, Schiff DM, Egan E ym.
21. **Early Exclusive Enteral Feeding in Preterm Infants: A Meta-Analysis.**
Pediatrics · 2026-08-13 · Santokh I, Fursule A, Dorasamy D ym.
22. **Extra-Endocrine Features in Infancy as Early Clues to MEN2B.**
Pediatrics · 2026-08-12 · Mirra G, Deodati A, Grossi A ym.
23. **Futility and Termination of Resuscitation Variation for Pediatric Out-of-Hospital Cardiac Arrest.**
Pediatrics · 2026-08-12 · Ramgopal S, Loftus K, Amagasa S ym.
24. **Hospitalization of Children in Foster Homes: A Canadian Cohort Study.**
Pediatrics · 2026-08-11 · Quinn A, Racine N, Trocmé N ym.
25. **Moving Upstream: Perinatal Cash Transfers as a Tool to Address Inequities in Birth Outcomes.**
Pediatrics · 2026-08-11 · Taylor K, He Y, Malawa Z
26. **Recommendations for Prevention and Control of Influenza in Children, 2026-2027: Policy Statement.**
Pediatrics · 2026-08-10 · Committee on Infectious Diseases
27. **Recommendations for Prevention and Control of Influenza in Children, 2026-2027: Technical Report.**
Pediatrics · 2026-08-10 · Committee on Infectious Diseases
28. **What's Old Is New Again: Varicella.**
Pediatrics · 2026-08-14 · Naureckas Li C, Edwards KM, Kaplan SL ym.
29. **Neurological effects of encapsulated dexamethasone sodium phosphate in children aged 6-9 years with ataxia telangiectasia (NEAT): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial.**
Lancet Child Adolesc Health · 2026-08-14 · Russo S, Zielen S, Pietrucha B ym.
30. **Rotavirus vaccine effectiveness against rotavirus and acute gastroenteritis mortality: an analysis of pooled case-control studies from the MNSSTER-V dataset.**
Lancet Child Adolesc Health · 2026-08-12 · Moran MC, Burnett E, Groome MJ ym.
31. **Anorectal malformations: an overlooked congenital anomaly in newborn care guidelines.**
Arch Dis Child · 2026-08-10 · Oyania F, Belay Tilahun E, Ozgediz D
32. **Rebuilding child health research capacity in the UK: a national survey of barriers and enablers from the Royal College of Paediatrics and Child Health.**
Arch Dis Child · 2026-08-10 · Ng SM, Stephens T, Carroll W
33. **Timing and incidence of health conditions recorded during childhood in White British and Pakistani British children: evidence from the Born in Bradford cohort.**
Arch Dis Child · 2026-08-14 · Santorelli G, Cheung RW, Bhopal S ym.
34. **Trends in neonatal mortality and morbidity at a tertiary centre over four decades: a cohort study.**
Arch Dis Child · 2026-08-13 · Prakash S, Saksena M, Sahoo T ym.
35. **Unplanned discharges and their impact on postdischarge mortality in Ugandan children: a multisite cohort study.**
Arch Dis Child · 2026-08-13 · Dadkhah Tirani D, Zhang C, Bose R ym.
36. **Using directed acyclic graphs in observational research: a practical guide for paediatric researchers.**
Arch Dis Child · 2026-08-14 · Smith MJ, Mansournia MA
37. **Beyond Organ Systems: Technology Dependence as a Defining Dimension of Medical Complexity.**
J Pediatr · 2026-08-13 · Lilitwat W
38. **Does Timing Matter? A Clinical Trial of Supporting Play Exploration and Early Development Intervention (SPEEDI) for Infants Born Preterm in the First Months of Life.**
J Pediatr · 2026-08-13 · Dusing S, Burns J, Spence C ym.
39. **Early Hospital Practices Were Associated With Exclusive Breastfeeding Among Late Preterm and Early Term Infants.**
Acta Paediatr · 2026-08-14 · Dib S, Wells JCK, Fewtrell MS

40. Long-Term Effects of Kangaroo Mother Care on Neuromotor Development in Adults Born Preterm: A Transcranial Magnetic Stimulation Study.
Acta Paediatr · 2026-08-14 · Gómez-Ramírez SM, Zuluaga-Gómez JA, Charpak N ym.
41. No Differences in Blood Pressure or Anthropometric Measures in 3-Year-Old Children After a Randomized Mediterranean Dietary Intervention During Pregnancy in Norway.
Acta Paediatr · 2026-08-10 · Troensegaard H, Veierød MB, Westerberg AC ym.
42. Survey on Delivery Room Ventilation of Preterm and Term Infants in German-Speaking Countries.
Acta Paediatr · 2026-08-12 · Brozek JC, Maiwald C, Warth PP ym.
43. The New Era of Respiratory Syncytial Virus Protection for Infants: A Mini Review of Current Tools for Immunoprophylaxis.
Acta Paediatr · 2026-08-14 · Heinonen S, Vartiainen P
44. Cystatin C: Not Only a Kidney Marker but Also a Potential Early Indicator of Metabolic Alterations in Childhood Obesity.
Horm Res Paediatr · 2026-08-11 · Mohn A, Di Pietro G, Maggitti A ym.
45. Temporal trends in hospitalization due to pediatric thyroid cancer in Chile: a population-based analysis from 2001 to 2024.
Horm Res Paediatr · 2026-08-14 · Mayol MC, Borzutzky A, Cavada G ym.

Automaattisesti tuotettu 20.8.2026 · v1.16.o. Lähde: PubMed / NCBI E-utilities. Tiivistelmä on tuotettu tekoälyllä alkuperäisistä abstrakteista — tarkista kliinisesti merkittävät tiedot alkuperäisjulkaisusta.